

Tableau 5

Bilan et suivi proposé pour NAF TTR

		NAF symptomatique		
Exploration		Initial	/ 6 mois	/ an
Poids, Indice de Masse Corporel		✓	✓	⊗
Évaluation neurologique	Questionnaires : CADT, SFN-SIQ	✓	✓	⊗
	Ex clinique : NIS, Étude sensitive chaud-froid, Hypotension, Jamar	✓	✓	⊗
	Score fonction : Stade PND / FAP	✓	✓	⊗
Électrophysiologie	ENMG, Variabilité R-R, Sudoscan®	✓	⊗	✓
Évaluation cardiologique	NYHA, ECG, BNP, troponine	✓	✓	⊗
	ETT +/- Holter ECG	✓	⊗	✓
Explorations complexes	IRM cardiaque, scintigraphie DPD, MIBG, test atropine	En centre de référence, au cas pas cas		
Évaluation néphrologique	DFG, microalbuminurie, protéinurie	✓	✓	⊗
Consultation ophtamologique	Acuité visuelle, LAF, TO, FO	✓	⊗	✓
Suivi thérapeutique	Pace Maker	Si appareillé, tous les 6 mois		
	Traitement pharmacologique	Bio / 6 mois, neuro / 6 mois (tolérance et efficacité)		
	Consultation hépatologie si TH	Rapprochée pendant 5 ans / Tous les ans au-delà de 5 ans		
	Ponction Biopsie Hépatique si TH	À 1,2 et 5 ans		

Selon points d'appel clinique : Gastroentérologie, urologie, néphrologie,...